

FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

---

Année 1962

THÈSE

N°

835

POUR LE

DOCTORAT EN MÉDECINE

DIPLOME D'ÉTAT

PAR

Jacques, Marie, Ferdinand BOURDEAU

né le 7 novembre 1929, à PHLIN (M et M)

---

Présentée et soutenue publiquement le :

---

CONTRIBUTION A L'ETUDE DE LA DIELECTROLYSE DES IONS  
COMPLEXES A PROPOS DE QUELQUES ESSAIS D'IONOPHORESE  
D'UN COMPOSE ANALGESIQUE

---

Président : Mr H. DESGREZ, Professeur.

---

EDITIONS A. G. E. M. P. — 8, RUE DANTE · PARIS-V<sup>e</sup>

---

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY

1911

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY

1911

FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

---

Année 1962

THÈSE

N°

POUR LE

DOCTORAT EN MÉDECINE

DIPLOME D'ÉTAT

PAR

Jacques, Marie, Ferdinand BOURDEAU

né le 7 novembre 1929, à PHLIN (M et M)

---

Présentée et soutenue publiquement le :

CONTRIBUTION A L'ETUDE DE LA DIELECTROLYSE DES IONS  
COMPLEXES A PROPOS DE QUELQUES ESSAIS D'IONOPHORESE  
D'UN COMPOSE ANALGESIQUE

---

Président : Mr H. DESGREZ, Professeur.

---

EDITIONS A. G. E. M. P. — 8, RUE DANTE . PARIS.V<sup>e</sup>

---

THESE

THESE

1872

DOCTORAT EN MEDICINE

THESE

THESE



CONTIENDE A LECTURE DE LA DOCTEUR EN MEDICINE  
CONTIENDE A LECTURE DE LA DOCTEUR EN MEDICINE  
CONTIENDE A LECTURE DE LA DOCTEUR EN MEDICINE

THESE

THESE

## PROFESSEURS HONORAIRES :

MM. Alajouanine (T.), Aubin (A.), Bénard (H.), Bulliard (H.), Cadenat (F.), Chabrol (E.), Champy (C.), Debré (R.), Fey (B.), Gastinel (P.), Halphen (E.), Hazard (R.), Heuyer (G.), Lantuejoul (P.), Laroche (G.), Lévy-Solai (E.), Lian (C.), Mathieu (P.), Mocquot (P.), Mondor (H.), Monod (R.), Moreau (R.), Moulonguet (P.), Olivier (E.), Pasteur Valléry-Radot, Petit-Dutaillis (D), Quénu (J.), Richet (C.), Senèque (J.), Strohl (A.), Tanon (L.).

DOYEN . . . . . Léon BINET.

*Membre de l'Institut*

1<sup>er</sup> ASSESSEUR . . . . . } Jean VERNE

2<sup>e</sup> ASSESSEUR . . . . . } Gaston CORDIER

## I. — PROFESSEURS

1<sup>o</sup> CHAIRES DE SCIENCES FONDAMENTALES

## a) Professeurs titulaires :

|                                                                     | MM.                |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Anatomie . . . . .                                                  | DELMAS (A.)        |
| Anatomie pathologique . . . . .                                     | DELARUE (J.)       |
| Anesthésiologie . . . . .                                           | BAUMANN (J.)       |
| Biochimie médicale . . . . .                                        | { JAYLE (M.-F.)    |
|                                                                     | { SCHAPIRA (G.)    |
| Biologie appliquée à l'Education physique et aux Sports . . . . .   | CHAILLEY-BERT (P.) |
| Biologie médicale . . . . .                                         | FAUVERT (R.)       |
| Cancérologie médicale et sociale . . . . .                          | BERNARD (J.)       |
| Embryologie . . . . .                                               | GIROUD (A.)        |
| Histoire de la médecine et de la chirurgie (Lariboisière) . . . . . | N...               |
| Histologie . . . . .                                                | VERNE (J.)         |
| Hygiène et médecine préventive . . . . .                            | JOANNON (P.)       |
| Médecine du Travail . . . . .                                       | DESOILLE (H.)      |
| Médecine légale . . . . .                                           | PIEDELIEVRE (R.)   |
| Microbiologie (Bactériologie et virologie) . . . . .                | FASQUELLE (R.)     |
| Parasitologie . . . . .                                             | GALLIARD (H.)      |
| Pathologie chirurgicale . . . . .                                   | HUGUIER (J.)       |
| Pathologie exotique . . . . .                                       | LAVIER (G.)        |
| Pathologie expérimentale et comparée . . . . .                      | MERKLEN (F.-P.)    |
| Pathologie médicale . . . . .                                       | MILLIEZ (P.)       |
| Pathologie respiratoire . . . . .                                   | TURIAF (J.)        |
| Pathologie et thérapeutique générales . . . . .                     | BOUDIN (G.)        |
| Pharmacologie . . . . .                                             | CHEYMOL (J.)       |
| Physiologie . . . . .                                               | { BINET (L.)       |
|                                                                     | { BARGETON (D.)    |
| Physiologie et pathologie obstétricale . . . . .                    | LEPAGE (F.)        |
| Physique médicale . . . . .                                         | { DOGNON (A.)      |
|                                                                     | { DJOURNO (A.)     |
| Radiologie médicale . . . . .                                       | DESGREZ (H.)       |
| Technique chirurgicale et Chirurgie expérimentale . . . . .         | N...               |
| Thérapeutique . . . . .                                             | CONTE (M.)         |

## b) Professeurs à titre personnel :

|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
| Biochimie médicale . . . . .             | { DESGREZ (P.)             |
|                                          | { POLONOVSKI (J.)          |
| Biologie médicale . . . . .              | BOURLIERE (F.)             |
| Embryologie . . . . .                    | TUCHMANN (H.)              |
| Hygiène et médecine préventive . . . . . | DEPARIS (M.)               |
| Parasitologie . . . . .                  | BRUMPT (L.-C.)             |
| Pathologie chirurgicale . . . . .        | LAURENCE (G.)              |
| Pharmacologie . . . . .                  | LÉVY (M <sup>lle</sup> J.) |
| Physiologie . . . . .                    | PARROT (J.)                |
| Physique médicale . . . . .              | KELLERSHOHN (L.)           |

## 2° CHAIRES DE SCIENCES CLINIQUES

### a) Professeurs titulaires :

|                                                                                                 | MM.                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Clinique carcinologique chirurgicale (Necker) . . . . .                                         | REDON (H.)                 |
| Clinique cardiologique (Broussais) . . . . .                                                    | MOUQUIN (M.)               |
| Cliniques chirurgicales . . . . .                                                               | LORTAT-JACOB (J.-L.)       |
| { Beaujon . . . . .                                                                             | LEGER (L.)                 |
| { Cochin . . . . .                                                                              | PATEL (J.)                 |
| { Hôtel-Dieu . . . . .                                                                          | CORDIER (G.)               |
| { Pitié . . . . .                                                                               | GOSSET (J.)                |
| { Saint-Antoine . . . . .                                                                       | SICARD (A.)                |
| { Salpêtrière . . . . .                                                                         | OLIVIER (Cl.)              |
| { Tenon . . . . .                                                                               | FÈVRE (M.)                 |
| Clinique de chirurgie infantile et orthopédique (Enfants Malades) . . . . .                     | MERLE d'AUBIGNÉ (R.)       |
| Clinique chirurgicale orthopédique et réparatrice (Cochin) . . . . .                            | GAUDART d'ALLAINES (F. de) |
| Clinique de chirurgie cardio-vasculaire (Broussais) . . . . .                                   | MATHEY (J.)                |
| Clinique de chirurgie pleuro-pulmonaire (Laennec) . . . . .                                     | DECOURT (J.)               |
| Clinique endocrinologique (Pitié) . . . . .                                                     | LAMY (M.)                  |
| Clinique de Génétique médicale (Enfants-Malades) . . . . .                                      | FUNCK-BRENTANO (P.)        |
| Clinique gynécologique (Broca) . . . . .                                                        | DEGOS (R.)                 |
| Clinique des maladies cutanées et syphilitiques (Saint-Louis) . . . . .                         | CATHALA (J.)               |
| Clinique des maladies des Enfants (Enfants-Malades) . . . . .                                   | MOLLARET (P.)              |
| Clinique des maladies infectieuses (Claude-Bernard) . . . . .                                   | DELAY (J.)                 |
| Clinique des maladies mentales et de l'encéphale (Sainte-Anne) . . . . .                        | HAMBURGER (J.)             |
| Clinique des maladies métaboliques (Necker) . . . . .                                           | MARCHAL (G.)               |
| Clinique des maladies du sang (Broussais) . . . . .                                             | CASTAIGNE (P.)             |
| Clinique des maladies du système nerveux (Salpêtrière) . . . . .                                | LENÈGRE (J.)               |
| Cliniques médicales . . . . .                                                                   | SOULIÉ (P.)                |
| { Boucicaut . . . . .                                                                           | JUSTIN-BESANÇON (L.)       |
| { Broussais . . . . .                                                                           | BROUET (G.)                |
| { Cochin . . . . .                                                                              | BARIÉTY (M.)               |
| { Cochin . . . . .                                                                              | SÈZE (S. de)               |
| { Hôtel-Dieu . . . . .                                                                          | DREYFUS (G.)               |
| { Lariboisière . . . . .                                                                        | KOURILSKY (R.)             |
| { Pitié . . . . .                                                                               | DEBRAY (C.)                |
| { Saint-Antoine . . . . .                                                                       | GENNES (L. de)             |
| Clinique médicale d'hydrologie thérapeutique et climatologie (Bichat) . . . . .                 | DEROT (M.)                 |
| Clinique médicale propédeutique (Broussais) . . . . .                                           | DAVID (M.)                 |
| Clinique médico-sociale du diabète sucré et des maladies de la nutrition (Hôtel-Dieu) . . . . . | GARCIN (R.)                |
| Clinique de neuro-chirurgie (Pitié) . . . . .                                                   | LACOMME (M.)               |
| Clinique neurologique (Salpêtrière) . . . . .                                                   | MERGER (R.)                |
| Cliniques obstétricales . . . . .                                                               | VARANGOT (J.)              |
| { Baudelocque . . . . .                                                                         | RENARD (G.)                |
| { Foch (Suresnes) . . . . .                                                                     | AUBRY (M.)                 |
| Clinique obstétricale et gynécologique (Port-Royal) . . . . .                                   | LELONG (M.)                |
| Clinique ophtalmologique (Hôtel-Dieu) . . . . .                                                 | MARIE (J.)                 |
| Clinique oto-rhino-laryngologique (Lariboisière) . . . . .                                      | BERNARD (E.)               |
| Clinique de pédiatrie et de puériculture (Saint-Vincent-de-Paul) . . . . .                      | MICHAUX (L.)               |
| Clinique de pédiatrie sociale (Enfants-Malades) . . . . .                                       | GOSTE (F.)                 |
| Clinique de pneumo-phthisiologie (Laennec) . . . . .                                            | DECHAUME (M.)              |
| Clinique de neuro-psychiatrie infantile (Salpêtrière) . . . . .                                 | ROUX (M.)                  |
| Clinique de rhumatologie médicale et sociale (Cochin) . . . . .                                 | LEMAIRE (A.)               |
| Clinique stomatologique (Pitié) . . . . .                                                       | GAULTIER (M.)              |
| Clinique thérapeutique chirurgicale (Vaugirard) . . . . .                                       | PADOVANI (P.)              |
| Clinique thérapeutique médicale (Saint-Antoine) . . . . .                                       | DOMART (A.)                |
| Clinique toxicologique . . . . .                                                                | POILLEUX (F.)              |
| Clinique traumatologique . . . . .                                                              | COUVELAIRE (R.)            |
| Sémiologie médicale . . . . .                                                                   | TURPIN (R.)                |
| Sémiologie et clinique chirurgicales . . . . .                                                  |                            |
| Clinique urologique (Necker) . . . . .                                                          |                            |
| Hygiène et clinique de la première enfance (Trousseau) . . . . .                                |                            |

### b) Professeurs à titre personnel :

|                    |   |                |
|--------------------|---|----------------|
| Médecine . . . . . | { | BOUR (H.)      |
|                    |   | LHERMITTE (F.) |
|                    |   | PEQUIGNOT (H.) |

## II. — PROFESSEURS SANS CHAIRE, PROFESSEURS AGRÉGÉS ET MAÎTRES DE CONFÉRENCES - AGRÉGÉS

|                                                                      | MM.                                                                                                                                                      |                                    | MM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anatomie . . . . .                                                   | CABROL (C.)<br>COUINAUD (C.)<br>GILLOT (C.)<br>OLIVIER (G.)<br>CAUTHIER-VILLARS (M <sup>lle</sup> P.)<br>pr. s. ch.                                      | Orthopédie . . . . .               | JUDET (R.)<br>MEARY (R.)<br>POSTEL (M.)<br>RAMADIER (J.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Anatomie pathologique . . . . .                                      | ABELANET (R.)<br>BUSSEY (F.)<br>CHOMETTE (G.)<br>GOUYGOU (Ch.), m. conf.<br>NEZELOFF (Ch.)<br>ORCEL (L.)<br>PAILLAS (J.)                                 | Oto-rhino-Laryngologie . . . . .   | DEBAIN (J.)<br>PIALOUX (P.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Anesthésiologie . . . . .                                            | KERN (E.)<br>VOURC'H (G.)                                                                                                                                | Parasitologie . . . . .            | GOLVAN (Y.)<br>LAPIERRE (J.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bactériologie . . . . .                                              | BARBIER (P.)<br>CHRISTOL (D.)<br>LE MINOR (L.)<br>TOURNIER (P.)                                                                                          |                                    | BARCAT (J.)<br>BINET (J.-P.)<br>CAUCHOIX (J.)<br>GERBONNET (G.)<br>CHATELIN (G.-L.)<br>DUBOST (Ch.)<br>DUBOST (Cl.)<br>FAUREL (J.)<br>FLABEAU (F.)<br>GARBY (M.)<br>GARNIER (H.)                                                                                                                                                                                                                                                |
| Biochimie médicale . . . . .                                         | BAULIEU Et. m. conf.<br>BOURILLON (R.)<br>CARTIER (P.)<br>DREYFUS (J.-Cl.)<br>GONNARD (P.)<br>KRUE (J.)<br>JEROME (H.)                                   | Pathologie chirurgicale . . . . .  | (Cl. de) GAUDART-d'ALLAINES<br>GERMAIN (A.)<br>LATASTE (J.)<br>LEVEQUE (B.)<br>LOYGUE (J.)<br>MERCADIER (M.)<br>NATALI (J.)<br>PELLERIN (D.)<br>PERROTIN (J.)<br>ROBERT (H.)<br>THOMERET (G.)                                                                                                                                                                                                                                   |
| Biologie appliquée à l'Education<br>Physique et aux Sports . . . . . | PLAS (F.)                                                                                                                                                |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Carcinologie . . . . .                                               | BOIRON (M.)<br>DENOIX (P.)<br>MATHE (G.)<br>SELIGMANN (M.)                                                                                               | Pathologie exotique . . . . .      | SCHNEIDER (J.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dermato-Syphiligraphie . . . . .                                     | CIVATTE (J.)<br>DUPERRAT (B.)                                                                                                                            |                                    | BENHAMOU (J.-P.)<br>BERTHAUX (P.)<br>BOIVIN (P.)<br>CROSNIER (J.)<br>HARTMANN (L.)<br>LÉPER (J.)<br>MAURICE (J.)<br>MIKOL (Cl.)<br>RICHEL (G.)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Electro-Radiologie . . . . .                                         | LEDoux-LEBARD (G.)                                                                                                                                       | Pathologie expérimentale . . . . . | AUSSANNAIRE (M.)<br>BOUVIER (J.)<br>BOUVRAIN (Y.)<br>BRICAIRE (H.)<br>BRISAUD (H.)<br>BROCARD (H.)<br>BUGE (A.)<br>CATINAT (J.)<br>CHRÉTIEN (J.)<br>COBLENTZ (B.)<br>CONTAMIN (F.)<br>COURY (C.)<br>ÉTIENNE (J.-P.)<br>FREZAL (J.)<br>FRITEL (D.)<br>HENNEQUET (A.)<br>HIMBERT (J.)<br>HOUSSET (E.)<br>LAROCHÉ (Cl.)<br>LESOBRE (R.)<br>MACREZ (C.)<br>MOREAU (L.)<br>NICK (J.)<br>ROYER (P.)<br>TOURNEUR (R.)<br>WOLFROMM (R.) |
| Hématologie . . . . .                                                | BESSIS (M.)<br>BILSKI-PASQUIER (G.)<br>DAUSSET (J.)<br>DUHAMEL (G.)                                                                                      |                                    | JOSEPH (R.)<br>LAFOURCADE (J.)<br>LEPERQ (G.)<br>MANDE (R.)<br>MOZZICONACCI (P.)<br>POLONOVSKI (C.)<br>ROSSIER (A.)<br>VIALATTE (J.)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Histologie . . . . .                                                 | COUJARD (R.), pr. s. ch.<br>MAROIS (M.)<br>RACADOT (J.)                                                                                                  |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Hydrologie . . . . .                                                 | BESANÇON (F.)<br>CORNET (A.)                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Hygiène . . . . .                                                    | BOYER (J.) pr. s. ch.<br>BLANCHER (G.)<br>CORRE-HURST (M <sup>me</sup> L.)<br>SAPIN-JALOUSTRE (H.)                                                       | Pathologie médicale . . . . .      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Maladies infectieuses . . . . .                                      | BASTIN (R.)<br>DUPONT (V.)                                                                                                                               |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Médecine légale . . . . .                                            | DEROBERT (L.), pr. s. ch.<br>FOURNIER (E.)<br>GUENIOT (M.)<br>HADENGUE (A.)                                                                              |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Médecine du travail . . . . .                                        | ALBAHARY (C.)                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Neuro-chirurgie . . . . .                                            | PERTUISET (B.)                                                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                      | GRANJON (A.)<br>HERVET (E.)<br>LE LORIER (G.)<br>LEVY (J.)<br>MORIN (P.)<br>MUSSET (R.)<br>ROBEY (M.)<br>SENEZE (J.)<br>SUREAU (C.)<br>THOYER-ROZAT (J.) |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Obstétrique . . . . .                                                | BRÉGEAT (P.)<br>DUBOIS (A.)<br>SARAUX (H.)                                                                                                               | Pédiatrie-Puériculture . . . . .   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ophthalmologie . . . . .                                             |                                                                                                                                                          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                | MM.                                                                                                        |                                 | MM.                                                                   |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Pharmacologie . . . . .        | BOISSIER (J.)<br>LECHAT (P.)<br>BARRES (G.)<br>DEJOURS (P.)<br>DURAND (J.)                                 | Psychiatrie . . . . .           | PICHOT (P.)                                                           |
| Physiologie . . . . .          | GIRARD m. conf.<br>HUGELIN (A.)<br>SCHERRER (J.)<br>CHANTEUR (J.)<br>GOUGEROT (L.), m. conf.<br>pr. s. ch. | Psychiatrie infantile . . . . . | DENIKER (P.)<br>DUCHE (D.)<br>FLAVIGNY (H.)<br>LAPRESLE (J.)          |
| Physique médicale . . . . .    | GREMY (F.) m. conf.<br>NILHAUD (G.)<br>PELLERIN (P.)<br>ROUGAYROL (J.-Cl)<br>TUBIANA (M.) m. conf.         | Rhumatologie . . . . .          | DELBARRE (F.)                                                         |
| Pneumo phthisiologie . . . . . | KREIS (B.)<br>MEYER (A.)<br>RENAULT (P.)                                                                   | Stomatologie . . . . .          | CERNEA (P.)<br>CHAPUT (M <sup>me</sup> A.) m. c. agr.<br>GRELLET (M.) |
|                                |                                                                                                            | Thérapeutique . . . . .         | CHASSAGNE (P.)<br>LAMOTTE (M.)<br>MARCHE (J.)                         |
|                                |                                                                                                            | Urologie . . . . .              | AUVERT (J.)<br>MOULONGUET (A.)<br>QUENU (L.)                          |

### III. — PROFESSEURS SANS CHAIRE ET AGRÉGÉS CHARGÉS DE COURS DE CLINIQUE ANNEXE à titre permanent.

|                                 | MM.                                                        |                                                     | MM.                          |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|
| Anatomie . . . . .              | DEBEYRE (J.)                                               | Clinique ophtalmologique . . . . .                  | DESIGNES (P.)<br>OFFRET (G.) |
| Clinique chirurgicale . . . . . | ABOULKER (P.)<br>AMELINE (A.), pr. s. ch.<br>VERNE (J.-M.) | Clinique oto-rhino-laryngo-<br>logique . . . . .    | MADURO (R.)                  |
| Clinique médicale . . . . .     | PERRAULT (M.)<br>RAMBERT (P.)<br>THIEFFRY (S.)             | Clinique pédiatrique et pué-<br>riculture . . . . . | LAPLANE (R.)                 |
| Clinique obstétricale . . . . . | GRASSET (J.)<br>MAYER (M.)                                 | Clinique psychiatrique . . . . .                    | BARUK (H.)                   |
|                                 |                                                            | Clinique urologique . . . . .                       | KUSS (R.)                    |

### IV. — PROFESSEURS DÉTACHÉS DANS LES UNIVERSITÉS ÉTRANGÈRES

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Bactériologie . . . . .           | HAUDUROY (P.) Pr. s. ch. |
| Pathologie chirurgicale . . . . . | RUDLER (J.) Pr. s. ch.   |

### V. — CHARGÉS DE COURS D'HYGIÈNE SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE

|                                                           |                                                                                    |                               |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Secrétaire général de la Faculté . . . . .                | M. LENA (J.)                                                                       | BOLTANSKI (E.)<br>LAUNAY (G.) |
| Secrétaire principal . . . . .                            | Mlle CHAINTREUIL (G.)                                                              |                               |
| Conservateur en Chef de la Bibliothèque                   |                                                                                    |                               |
| Conservateur du Musée d'Histoire de la Médecine . . . . . | M. le Docteur HAHN (A.)                                                            |                               |
| Conservateur . . . . .                                    | Mlle DUMAITRE (P.)                                                                 |                               |
| Bibliothécaires . . . . .                                 | Mmes CONTET (J.), FORGET (F.),<br>Miles LAURENT (H.), LE NOIR (G.), QUIÉVREUX (E.) |                               |

Par délibération en date du 9 décembre 1798, l'Ecole a arrêté que les opinions émises dans les dissertations qui lui seront présentées, doivent être considérées comme propres à leurs auteurs et qu'elle n'entend leur donner aucune approbation ni improbation.

- A ma mère,

avec ma reconnaissante affection,

- A ma femme,

pour tout le bonheur qu'elle m'a apporté.

- A mes enfants.



Digitized by the Internet Archive  
in 2026

[https://archive.org/details/IA41552010\\_0063](https://archive.org/details/IA41552010_0063)

A notre Président de Thèse

Monsieur le Professeur H. DESCREZ

Professeur de la Chaire de Radiologie  
médicale de la Faculté de médecine de PARIS,

Electro-Radiologiste des Hopitaux de Paris,

Membre de l'Académie de Médecine,

Chevalier de la Légion d'Honneur,

qui nous a fait le grand honneur d'accepter la présidence de notre thèse,

En témoignage de notre respectueuse reconnaissance.



Nous tenons à remercier ,

Monsieur le Docteur HEITZ

Professeur agrégé d'Electro-Radiologie  
des Facultés de Médecine.

qui nous a inspiré ce travail.

Qu'il veuille trouver ici, le témoignage  
de notre gratitude.



A nos maîtres dans les Hopitaux de Paris.



CONTRIBUTION A L'ETUDE DE LA DIFLECTROLYSE DES  
IONS COMPLEXES A PROPOS DE QUELQUES ESSAIS  
D'IONOPHORESE D'UN COMPOSE ANALGESIQUE



## P L A N

### - INTRODUCTION

#### - Rappel historique des premiers travaux

#### - Diélectrolyse d'un composé analgésique.

I - Matériel expérimental

II - Expérience et résultats

III - Critiques

IV - Diélectrolyse fractionnée des constituants.

#### - Normes générales pour la diélectrolyse d'un ion complexe

I - Notions fondamentales

II - Principaux dispositifs expérimentaux

III - Mode d'action in vivo

#### - Essais récents de diélectrolyse des ions complexes

### - CONCLUSION

### - BIBLIOGRAPHIE



## I N T R O D U C T I O N

Si la diélectrolyse de l'ion salycilé a encore gardé quelque faveur auprès des médecins, souvent d'ailleurs après que l'on ait épuisé les ressources de thérapeutiques plus agressives sinon plus actives, il semble que les nombreuses autres possibilités d'introduction électrolytique d'un ion complexe a visé curatrice ou diagnostique restent à peu près ignorées ou pour le moins des médications d'exception.

La validité du principe même de la diélectrolyse ne saurait pourtant être remise en question. S'il était nécessaire, il suffirait de rappeler les nombreux travaux que cette méthode a motivés, l'enthousiasme et les espoirs qu'elle a suscités chez les médecins électrologistes d'il y a cinquante ans.

De nombreux chercheurs se sont efforcés d'introduire dans l'organisme par diélectrolyse des ions plus lourds ou plus complexes que ceux couramment employés soit que cette voie d'administration présentât des avantages particuliers pour le traitement de l'affection en cause, ou qu'elle permît d'éviter au malade les inconvénients de toxicité des voies parentérales et digestives habituellement utilisées.

C'est à partir de l'étude d'une substance analgésique complexe, formée d'un mélange en proportions définies selon une formule magistrale, que nous tentons de dégager les principales règles, de la dissociation et du transfert ionique d'une substance pharmacologique complexe.

Outre le dispositif expérimental simple employé et décrit dans cette expérience, nous passons en revue rapidement les diverses méthodes plus précises, mais aussi plus complexes qui pourraient être utilisées dans un travail de ce genre, et donner théoriquement des résultats concordants.



En ce qui concerne les substances analgésiques qui nous intéressent plus spécialement ici, il n'a été publié pratiquement, que des travaux sur l'ion salicylé et les anesthésiques locaux.

Toutes les voies de recherche sont pourtant loin d'être épuisées dans le domaine du traitement loco-dolonti en rhumatologie et en traumatologie, si l'on pense, en particulier, aux multiples acquisitions récentes de la pharmacopée.



## RAPPEL HISTORIQUE DES PREMIERS TRAVAUX

Bien avant les travaux de G. BOURGUIGNON qui fut le véritable promoteur de la diélectrolyse, il convient de citer les principaux artisans de l'édification de nos connaissances en matière d'électrolyse.

1744 - NOLLET songe à utiliser une machine électrostatique pour l'introduction de substances médicamenteuses dans l'organisme.

1749 - PRIVATI développe la même idée.

1802 - ROSSI fait pénétrer, grace au courant continu, une quantité appréciable de mercure dans le derme mis à nu après application d'un vésicatoire.

1833- PALAPRAT introduit des médicaments grace à la pile de VOLTA

1859 - RICHARDSON réalise les premières diélectrolyses à visée analgésique. Au cours d'expériences successives, il place au pôle positif des sels de morphine, des sels d'aconitine, et du chloroforme en solution aqueuse.

1866 - WAGNER & CORNING réussissent des interventions chirurgicales après diélectrolyse de cocaïne sur la voie d'abord.

1873 - MUNKS déclenche des contractions chez le lapin après diélectrolyse d'une solution de sulfate de strychnine.

- La même année, ENGEL, dans une thèse de la faculté de médecine de Nancy pense extraire diverses substances métalliques de l'organisme par application d'un courant galvanique. Ses conclusions expérimentales prouvent une action faible mais réelle d'un tel courant et sont confirmées par des acquisitions plus récentes sur les phénomènes



osmotiques au niveau des membranes biologiques.

1887 - KEHLRAUSCH définit la notion de conductivité électrique d'une solution d'électrolytes.

1900 - LEDUC au premier congrès international d'electrologie et de radiologie médicale montre sans équivoque possible comment l'introduction des ions à travers la barrière cutanée grâce au courant continu est l'équivalent d'une injection intra-veineuse sans effraction cutanée.

- Quelques années plus tard, ZIMMERN, étudie la diélectrolyse de la carbaïne et son action pharmacodynamique appliquée à l'anesthésie de surface. Il compare l'effet obtenu à celui d'une injection parentérale du même produit. L'ionisation de la molécule de carbaïne aboutit à la formation de deux sortes de radicaux dont l'un est responsable de toute l'activité pharmacodynamique sans que celle-ci soit modifiée par la dissociation électrolytique.

1913 - A partir de cette date, dans son service de la Salpêtrière, le Dr BOURGUIGNON dégage peu à peu les grandes règles de la diélectrolyse des médicaments. Il met définitivement au point une technique précise d'applications psychiopathologiques en normalisant le protocole des traitements. Il préconise :

- des solutions chimiquement pures,
- faiblement concentrées,
- des intensités faibles,
- des électrodes localisées,
- enfin des règles très précises sur la durée, la fréquence et le nombre des séances d'ionisation.

Actuellement encore les traitements sont conduits à peu de chose près selon la technique qu'il a su mettre en valeur.



## DIELECTROLYSE D'UN COMPOSE ANALGESIQUE

Nous choisissons pour cette étude un composé analgésique employé depuis plusieurs années par voie digestive pour ses propriétés sédatives et antipyrétiques. Ce produit est prescrit depuis peu en application externe dans un service de rhumatologie parisien dans le traitement de certaines formes hyperalgiques d'affections rhumatismales, telles que : périarthrites scapulo-humérales et dorso-lombalgies.

Nous tenterons dans un premier temps, de vérifier les possibilités d'utilisation en diélectrolyse avec quelques chances de succès du produit tel qu'il est fourni par le laboratoire.

Dans l'affirmative, il serait possible de comparer les valeurs respectives des deux méthodes sur une série de malades :

- diélectrolyse pour les uns,
- application sous formes de lotion ou de pommade accompagnée de massages pour les autres,



## I - MATERIEL EXPERIMENTAL

- 1) Composé analgésique. La formule du composé analgésique utilisé au cours de ces expériences est la suivante :

|                                                               |            |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| Phénylacétamide.....                                          | 0,10       |
| Méthylphénylacétamide.....                                    | 0,10       |
| Ethoxyparaacétanilide.....                                    | 0,10       |
| 4-diméthylamine, 2-phényl,<br>1-5 diméthyl, 3-pyrazolone..... | 0,15       |
| 1-3-7 triméthylxanthine .....                                 | 0,05       |
| Chlorydrate de codéthyline.....                               | 0,02       |
| Quinquina succirubra.....                                     | 0,05       |
| Excipient carbonex 400... q.s.....                            | pour 10 g. |

L'excipient constituant un secret de fabrication il n'est pas possible d'en connaître la composition d'une manière très précise. Il assure le maintien en solution de substances pour la plupart difficilement solubles, parfois même incompatibles, et par son pouvoir tampon maintient la constance du pH.

- 2) Matériel biologique. Toutes nos expériences de diélectrolyse sont faites sur un même substrat biologique : le tubercule de pomme de terre. Ce matériel simple et peu coûteux permet de faire de très nombreuses manipulations sans que les conditions expérimentales varient dans le temps. Mais il existe encore deux raisons supplémentaires de l'employer :

- Le passage du courant galvanique aux intensités adoptées n'apporte aucune modification macroscopiquement décelable sur la pulpe du tubercule.
- La pulpe constitue en outre un support commode pour les réactions colorées utilisées en vue de caractériser la diélectrolyse.



Nous découpons au moment de chaque essai des parallélépipèdes de taille identique 4 x 3 x 1,5 cm pris dans le coeur du tubercule.

### 3) Réactions colorées de caractérisation.

Deux réactifs colorés différents sont utilisés concurremment pour établir la preuve du tranfert électrolytique de la fraction dissociable du composé analgésique.

- Le réactif de Follin-Denis qui a normalement une teinte bleu-vert vire au violet au contact de la pulpe fraîche de la pomme de terre, et prend une teinte bleu roi en présence du composé analgésique. Ces différences de tonalités de couleur sont en pratique aisément appréciées.
- Le réactif au perchlorure de Fer est jaune en solution suffisamment diluée, il ne vire pas au contact de la pulpe de pomme de terre, mais après diélectrolyse de la substance analgésique il prend une coloration brun foncé.


Ces deux réactions colorées pourront être interprétées au point de vue chimique dans la seconde série d'expériences portant sur chacun des constituants du composé analgésique.

### 4) Appareillage électrique pour diélectrolyse.

Les expériences de diélectrolyse pour ce travail ont été faites indifféremment sur deux sources différentes de courant continu.

a) La source de courant continu de la Faculté de Médecine de Paris donne 110 volts aux bornes. Nous fabriquons avec trois résistances de 2.000 ohms un réducteur de potentiel de manière à obtenir environ 10 mA. dans le circuit d'utilisation.





b) Un appareil de galvanisation de type commercial que l'on utilise couramment en physiothérapie, et qui donne un courant redressé et filtré.

Ce type d'appareil doit fournir un courant dont le taux de ronfle, c'est à dire le rapport du signal alternatif sur signal continu, doit être inférieur à 5/1000 de la tension totale. Le fait d'utiliser l'une ou l'autre source en donne lieu à aucune variation sensible dans l'expérience envisagée, le courant sinusoïdal redressé et filtré étant en pratique très peu différent du courant continu vrai.






Schéma d'un appareil de physiothérapie fournissant du courant galvanique.



## II - EXPERIENCE ET RESULTATS

L'essai de la diélectrolyse de cette substance complexe est fait successivement aux pôles positif. et négatif.

1) Expérience. Pour chaque polarité et pour chaque réactif nous faisons les quatre essais suivants :

| a) <u>Pôle +</u>                        | <u>Coloration au pôle -</u>                                                          |                                                                                       |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | F.Denis                                                                              | C 13 Fe                                                                               |
| - 1 - milieu + réactif                  |    |    |
| - 2 - milieu + réactif+ composé         |    |    |
| - 3 - milieu+ courant+ réactif          |   |   |
| - 4 - milieu+ courant+ réactif+ composé |  |  |
| b) <u>- pôle -</u>                      | <u>Coloration au pôle +</u>                                                          |                                                                                       |
|                                         | F.Denis                                                                              | C 13 Fe                                                                               |
| - 1 - milieu+ réactif                   |  |  |
| - 2V- milieu+ réactif+ composé          |  |  |
| - 3 - milieu+ réactif+ courant          |  |  |
| - 4 - milieu+ courant+ réactif+ composé |  |  |

### 2) Résultats.

Le réactif de Follin-Denis prend une teinte bleu-violet au contact de la pulpe de pomme de terre. Cette coloration se distingue nettement du bleu roi caractéristique de la présence du composé analgésique.

La durée de chaque diélectrolyse est de 60 minutes.



a) Le composé est au pôle + :

Cette coloration n'apparaît pas en 2, ce qui tend à prouver que les phénomènes de diffusion sont négligeables.

Son apparition en 4, fait penser qu'il y a bien eu transfert ionique lors du passage du courant.

b) Le composé est au pôle - :

Les quatre échantillons ont une coloration à peu près semblable après une heure de passage du courant. Il n'y a pas eu d'ionophorèse décelable par les réactifs colorés utilisés.

c) Les résultats donnés par le second réactif : le perchlorure de fer concordent avec ceux du réactif de Follin-Denis.

d) Il semble donc possible d'affirmer, dès lors, qu'il existe dans le composé analgésique une fraction dissociable qui se comporte comme un cation, et que l'on peut caractériser après son transfert électrolytique.



### III - CRITIQUES

---

On admet généralement que le passage du courant est l'équivalent du déplacement dans des directions opposées de charges élémentaires négatives et positives supportées par des atomes ou des groupements d'atomes étroitement liés.

Les ions et radicaux ainsi formés se déplacent dans le sens déterminé par les charges qu'ils supportent, à une vitesse qu'il est possible d'apprécier et qui varie notablement avec la taille du véhicule ionique. Le transfert des charges électriques négatives ou positives est basé dans les deux cas sur un échange d'électrons. Il se fait plus volontiers au bénéfice des ions monatomiques les plus légers disponibles.

Si l'on peut admettre qu'un ion complexe soit formé à partir de ce composé, comment concevoir qu'il puisse être transporté d'un pôle vers l'autre à travers une substance biologique extrêmement riche en ions monoatomiques légers et mobiles, sans être rapidement précipité à l'état neutre.

Il existe évidemment une contradiction nette entre la théorie et le résultat expérimental. Aussi avons-nous poursuivi ce même type d'expériences avec chacune des substances chimiques entrant dans la formule du composé analgésique. Nous étudions leurs propriétés électrochimiques et en cas de dissociation électrolytique, nous vérifions la réalité et le sens du transfert ionique.



#### IV - DIELECTROLYSE FRACTIONNEE DES CONSTITUANTS

---

Pour lever la contradiction énoncée ci-dessus, nous faisons donc une série d'expériences de diélectrolyse portant sur chacun des principaux constituants.

- L'Acétanilide ou Phénylacétamide.
- La Phénacétine ou Ethoxyparaacétanilide
- Le Pyramidon ou Amidopyrine
- La Caféine ou Triméthylxanthine

##### 1) Propriétés électrochimiques des composants

Chaque substance est étudiée séparément en ce qui concerne ses caractéristiques de solubilité dans l'eau, les solvants organiques et les acides, son  $\Delta$  cryoscopique et son pH, en solution.

Toutes ces constantes permettent de calculer un coefficient d'activité ionique.

Il suffit alors de trouver une réaction colorée élective pour la caractérisation de la diélectrolyse de chacune de ces substances.

Nous essayons en outre sur chaque élément les réactifs utilisés dans la première série d'expériences.

Successivement sont ainsi étudiés les composants suivants :

- a) Acétanilide
- b) Phénacétine
- c) Méthylacétanilide
- d) Pyramidon
- e) Caféine



a) Acétanilide ou Phénylacétamide

- Formule :  $C_6H_5 - NH - CO - CH_3$
- Poids moléculaire : 135,16
- pH : 6,4
- Solubilité : 1 g. dans 185 ml eau  
1,1 g. dans 20 ml eau à 100°  
1 g. dans 3,7 ml chloroforme
- Caractérisation chimique :
  - traiter avec 1 ou 2 ml de HCl à ébullition
  - neutraliser avec NaOH, 15° B
  - ajouter quelques ml. d'hypochlorite de calcium  
On observe une coloration blanc sale.
- Réactif de Follin-Denis et au Perchlorure de Fer : L'Acétanilide ne donne pas de réaction colorée avec ces deux réactifs.

b) Phénacétine, ou Acétophénitidine, ou p-éthoxyacétanilide.

- Formule :  $C_6H_4 \begin{array}{l} \nearrow O - C_2H_5 \\ \searrow NH - CO - CH_3 \end{array}$
- Poids moléculaire : 179,21
- pH : 5,3
- Solubilité : 1 g. dans 1.31 ml eau  
1 g. dans 82 ml eau à 100°  
1 g. dans 14 ml chloroforme.
- Caractérisation chimique :
  - ajouter quelques gouttes de  $SO_4H_2$   
pas de coloration
  - ajouter une goutte de  $NO_3H$  fûmant :  
on observe une coloration jaune-orangée.
- Réactif de Follin-Denis :
  - Formation d'un précipité blanc qui se redissout



- Réactif au Perchlorure de fer :

- pas de changement de coloration

c) n - Méthylacétanilide, ou méthylphénylacétamine

ou acétométhylanilide

ou exalgine

- Formule :  $C_6H_5 - N \begin{cases} CH_3 \\ CO - CH_3 \end{cases}$

- Poids moléculaire : 149,19

- pH. 6,4

- Solubilité : 1 g. dans 60 ml. eau

1 g. dans 2 ml. eau à 100°

1 g. dans 1,5 ml chloroforme.

- Caractérisation chimique :

- Il n'existe pas de réaction spécifique, si ce n'est une caractérisation négative : à l'encontre de l'acétanilide, il ne donne pas de coloration avec l'hypochlorite de calcium.

- Réactif de Follin-Denis :

- Précipité blanc qui se redissout.

- Réactif au Perchlorure de fer :

- Pas de modification de coloration.

d) Pyramidon, ou amidopyrine

- Formule :  $(CH_3)^2 - N \begin{array}{c} \text{O} \\ || \\ \text{CH}_3 - \text{C} - \text{N} - C_6H_5 \end{array}$

- Poids moléculaire : 331,29

- pH : légèrement alcalin en solution aqueuse.

- Solubilité : 1 g. dans 18 ml. eau

1 g. dans 1 ml. chloroforme. La solubilité augmente encore par addition de Benzoate de soude.







#### 4) Conclusion.

Il ne peut donc être question de comparer d'une manière très valable les effets de l'introduction percutanée du composé analgésique complexe par les deux moyens prévus : diélectrolyse d'une part et massages de l'autre. Dans le cas présent, la seule possibilité laissée à l'étude comparative des deux procédés est celle d'employer une solution désicnisée de pyramidon dans le premier cas et du pyramidon adsorbé sur un excipient gras dans le second.

On remarque qu'il existe de nombreuses similitudes entre les deux voies d'administration bien qu'elles soient basées sur des principes physiques très dissemblables. Seul le mécanisme de traversée de la barrière cutanée est différent.

La substance médicamenteuse introduite sous la peau est libérée dans les deux cas avec ses propriétés pharmacodynamiques intactes. Elle est, soit précipitée à l'état neutre à partir de l'ion, soit libérée de substrat adsorbant.


Les deux modes d'application s'accompagnent d'une vaso-dilatation locale favorable. La substance peut-être ainsi utilisée sur place ou dans les tissus immédiatement voisins à une concentration élevée sans pour autant entraîner de signes d'intoxication centrale.

La dose active par voie diélectrolytique est bien moins élevée que celle qui devrait être administrée par voie générale pour atteindre la même concentration locale et aboutir au même effet.



celles-ci sont placées au pôle positif, et dans un second temps, après renouvellement du diélectrolyte, au pôle négatif.

Le réducteur de potentiel est réglé pour fournir dans le circuit d'utilisation un débit de 10 mA. environ. Après une diélectrolyse de 60 mn, le réactif est déposé sur une tranche de section perpendiculaire au trajet des lignes de force et pratiquée à quelques mm de la surface d'application de l'électrode.



### 3) Résultats.

Des cinq corps chimiques testés aux pôles positif et négatif, seul, le radical basique du pyramidon est susceptible de migration par diélectrolyse. Celle-ci s'effectue quand on place le pyramidon au pôle positif. Le radical transporté se comporte comme un cation. Les propriétés électrochimiques du pyramidon, les réactions colorées observées à l'issue de la première expérience sur le complexe n'est en fait, que la diélectrolyse de l'un de ces composants : le radical basique du pyramidon.



## NORMES GENERALES POUR LA DIELECTROLYSE D'UN ION COMPLEXE

De nombreuses substances employées en application externe pourraient l'être également en diélectrolyse avec les avantages que comporte cette méthode, à la condition de répondre à certaines normes physico-chimiques.

Il importe avant tout que le corps employé soit chimiquement pur sous peine de voir se modifier considérablement son activité ionique.

### I- NOTIONS FONDAMENTALES DE DIELECTROLYSE IN VITRO

Il suffit de rappeler quelques notions théoriques essentielles concernant la diélectrolyse.

#### 1) Polarité d'une substance en solution.

D'une manière générale, si l'on assimile les ions complexes à des sels, les bases qui en dérivent, quelque soit leur complexité, sont des cations ; les éléments acides ou tenant lieu d'acide, simples ou complexes sont des anions.

#### 2) Degré de dissociation.

Il représente la fraction des molécules qui subit la dissociation électrolytique. Le degré de dissociation est inversement proportionnel à la concentration de la solution. Si la solution est suffisamment diluée, il devient très voisin ou égale à 1.

En pratique, ceci tendrait à ne faire utiliser en diélectrolyse que des solutions faiblement concentrées (1 à 3 %).



Mais parfois, il peut-être plus intéressant d'opérer avec des . . solutions plus concentrées, qui pourraient pour certains, modifier la résistance globale de la peau. Les membranes biologiques et la peau en particulier se comporteraient comme des couches de semi-conducteurs et l'épiderme serait plus perméable aux cations qu'aux anions à forte concentration.

### 3) Différence de conductivité

Les mesures de conductivité d'une solution d'électrolyse se ramènent, d'après la définition même de ce terme, à une mesure de résistance.

Par analogie avec la formule qui donne la résistance d'un solide au passage du courant électrique.

$$R = \rho \frac{l}{S} \quad \text{dans laquelle } \rho \text{ est la résistivité en Ohm/cm}$$

L'inverse d'une résistance est une conductance donnée en  $\text{Ohm}^{-1}$  ou mhos ou Siemens.


L'inverse d'une résistivité est une conductivité en  $\text{Ohm/cm}$ .

On utilise un montage pont de Wheatstone à courant alternatif oscillographe cathodique, pour chiffrer les différences de conductivité.

### 4) Lignes de force

Les lignes de force du courant sont facilement matérialisées, et apparaissent clairement sur des coupes en série perpendiculaires à leur direction de pôle à pôle. La réaction colorée est plus intense au niveau de certains points limités, périphériques, disposés en couronne, et dessine grossièrement une projection de la surface des électrodes.





en pointillé : Surface de l'électrode  
(projection sur la coupe transversale)



La migration de l'ion est observée soit directement, s'il est normalement coloré, soit dans le cas contraire, après matérialisation qui peut se faire selon le cas de plusieurs façons :

a) Après séchage de la bande d'électrophorèse, pulvérisation d'un réactif électif ou action de vapeurs de diverses substances.

b) L'emploi d'un marker radio-actif  $\beta$  ou  $\gamma$  peut être intéressant dans le cas de quantité très faible de substance, ou d'un mélange d'ions difficile à caractériser autrement. La bande défile sous un compteur qui lit l'activité : la zone de plus grande activité est parfaitement définie par l'existence d'un pic sur l'enregistrement de l'intégrateur.

## 2) Bacs à électrolyse.

Il s'agit d'un matériel classique dont il existe de nombreux modèles.

On utilise différentes sortes de diélectrolyses, essentiellement des gels hydratés :

- agar-agar
- méthyl cellulose
- glycérolé d'amidon

Le réactif peut dans certaines conditions être incorporé au gel.

## 3) Ionophorèse à travers une membrane de collodion

Il existe une différence de conductivité de la membrane selon que le courant est direct ou inversé. Celle-ci peut donc être considérée comme un semi-conducteur.

## 4) Ionophorèse à travers une peau de batracien

Un lambeau cutané est maintenu en survie dans une solution de Ringer. Ce dispositif est celui qui se rapproche le mieux des conditions d'utilisation clinique. Il est possible de mesurer les quantités d'ions qui passent d'un compartiment à l'autre ainsi que les vitesses relatives de leur électrophorèse. En fait, les résultats sont comparables à ceux fournis par les autres méthodes.



### III - MODE D'ACTION DE LA DIELECTROLYSE IN VIVO

---

#### 1) Voies de pénétration des ions.

Il semble bien que la majeure partie des échanges ioniques à travers la peau, dans les deux sens, se fasse au niveau des pores cutanés. Les canaux excréteurs des glandes sudoripares s'ouvrent à l'extérieur par ce petit partuis après avoir traversé le derme. Le pore est parfois visible à l'oeil nu, c'est à dire, que son échelle de grandeur est encore loin d'être comparable à celle d'une molécule complexe fut-elle volumineuse. Le nombre de pores est variable selon la région envisagées et selon les individus : en moyenne 120 pores par  $\text{cm}^2$ .

Il existe de nombreuses preuves de la réalité de ce mode de traversée de la barrière cutanée. La diélectrolyse d'une solution de permanganate de potasse est historique : la peau n'est pas uniformément colorée et il apparait un fin piqueté bleuté dont chaque point correspond à un pore.

La pénétration en profondeur est étudiée par la diélectrolyse des sels d'argent. L'argent est précipité à quelques millimètres sous la couche épidermique, où il est facile de le mettre en évidence par des colorations spécifiques.

La profondeur atteinte est toujours très faible. Le relai des charges à transporter est très rapidement pris par des ions plus légers et plus mobiles.

Si l'on observe le sens du courant, on ne parvient jamais à faire ressortir les ions qui ont été introduits en raison justement de la présence sur place d'un grand nombre d'ions monoatomiques, beaucoup plus mobiles, et disponibles.

Un autre aspect de ces phénomènes de compétition ionique est l'existence presque inévitable d'ions parasites dans la diélectrolyse d'une substance quelconque. Leur présence fausse l'interprétation du résultat. On s'efforcera donc par tous les moyens d'éviter cet ecueil en employant :

- des électrodes d'étain entourées d'une tarlatane serrée ou d'une éponge synthétique,



- un solvant très pur au point de vue ionique
- des électrolytes médicamenteux chimiquement purs,
- des surfaces d'application nettoyées à l'éther et rincées ensuite à l'eau bi-distillée.

Enfin la vitesse des ions n'est pas directement proportionnelle à la charge électrique transportée et inversement proportionnelle à leur taille. En effet, certains ions peuvent fixer une ou plusieurs molécules d'eau. Ainsi, un ion monoatomique (métal par exemple) peut devenir un ion complexe vrai.

## 2) Variations physio-pathologiques.

Il existe des différences très sensibles de conductivité ionique selon la région, l'individu et même l'état de la peau.

Il existerait enfin une conductivité plus grande des tissus néoplasiques qui pourrait être liée à une plus grande perméabilité des membranes biologiques.

## 3) Métabolisme des substances introduites par diélectrolyse.

Leur élimination est très ralentie par rapport à celle consécutive aux autres modes d'administration. La zone d'action du médicament est avant tout locale : derme et tissus sous-jacents; avant qu'il soit entraîné dans la circulation générale. La libération des substances introduites dans le derme de cette manière ne peut être que progressive par une succession d'échanges inter et extra cellulaires jusqu'aux capillaires sanguins. Il s'agit donc là d'une véritable action retard et c'est ainsi que le bénéfice d'une séance de diélectrolyse n'apparaît qu'après un certain délai.

La preuve de cette élimination retardée est apportée par de nombreux travaux. Cette étude peut être faite au moyen d'isotopes radioactifs ou de molécules marquées comme elle l'a été déjà dans un but quelque peu différent avec l'iode 131 et le strontium 90. L'iode est capable de diffuser très rapidement dans l'organisme à travers la barrière cutanée, dans les proportions notables, sans aucun secours extérieur et seule une étude quantitative précise pourrait montrer l'action propre du courant galvanique.



#### 4) Incidents et accidents.

La peau ne tolère pas l'introduction de n'importe quelle substance et il faudra souvent s'assurer avant tout traitement de l'absence de susceptibilités individuelles d'origine allergique pour éviter de graves réactions.

L'introduction sous la peau de la cocaïne entraînait des dystrophies cutanées lorsqu'elle était employée pour des anesthésies locales.

Il convient également de rappeler pour mémoire les incidents liés à des fautes de technique :

- brûlures par électrode en partie desséchée
- ou par le mauvais isolement d'un fil conducteur
- secousses désagréables par établissement rapide de l'intensité maximum.



## ESSAIS RECENTS DE DIELECTROLYSE DES IONS COMPLEXES

### 1) Le Flaxédil

ou triiodoéthylate de Gallamine, traverse parfaitement la peau malgré la taille de sa molécule. C'est un curarisant de synthèse, pachycurare à action prolongée. Il est employé en solution à 4 o/oo Amphotère, il peut être appliqué aux deux pôles. On emploiera de préférence le pôle + pour bénéficier de l'action antalgique du pôle positif. On cite son emploi avec succès dans divers syndromes où domine une contracture musculaire douloureuse : lumbagos, sciatalgies, torticolis etc... Il pourrait être utilisé avantageusement pour le traitement des séquelles de poliomyélite, où la contracture des antagonistes des muscles touchés est souvent extrêmement gênante à une période où l'on peut encore espérer une récupération fonctionnelle et où il faut parfois se résoudre à des interventions chirurgicales mutilantes.

### 2) L'Histamine

est un excitant puissant des fibres lisses. L'injection intradermique de 1/10 ml. déclenche une réaction cutanée locale caractéristique :

- rougeur locale,
- érythème réflexe en cocarde,
- boule d'œdème.

On réalise aussi facilement la triade de Lewis après quelques minutes de passage du courant par la diélectrolyse d'une solution de bichlorhydrate d'histamine à 1/5000.



Cette réaction peut servir de test d'activité pour de nombreuses substances anti-histaminiques. On peut les classer selon leur faculté d'empêcher l'apparition de la triade de Lewis.

### 3) La Pilocarpine,

Alcaloïde du *Pilocarpus jaborandi*, c'est un corps à action parasympatomimétique. Il est utilisé de même que l'acétylcholine comme test de la sympathycotanie. On emploie ici la forme soluble dans l'eau (nitrate de pilocarpine) placée au pôle positif. Elle favorise la sudation et, est employée dans le traitement des alopecies sous forme de lotion et de pommade. La diélectrolyse pourrait trouver là une nouvelle application.

### 4) La Thiozinamine,

Cette grosse molécule fournit un ion complexe ~~pratiquement sans~~ dissociation. Elle est surtout employée avec succès dans la cure de la sclérose des corps caverneux. La maladie de Dupuytren et la maladie de Ledderhose peuvent également bénéficier d'un traitement par diélectrolyse de Thiozinamine au pôle positif.

### 5) Les Sulfamides.

L'emploi d'un composé capable de dissociation ionique permet une sulfamidothérapie locale très active après application de diélectrolyse.



## C O N C L U S I O N

Le composé analgésique étudié ne peut être considéré comme une entité du point de vue électrochimique. Il se forme en solution plusieurs sortes d'ions.

Malgré les phénomènes de compétition ionique, un ion complexe tel que celui formé à partir de la molécule d'amydopyrine, est parfaitement capable de migrer dans ces conditions mais avec un rendement faible, difficile à chiffrer, et qui ne permettrait certainement pas d'obtenir une concentration intéressante au cours d'une diélectrolyse thérapeutique.

Il n'est pas possible d'établir une comparaison au point de vue pharmacodynamique entre un composé complexe qu'on tente de faire pénétrer à travers la barrière cutanée par des massages et les fractions ioniques de ce même composé introduites par diélectrolyse.

Par contre, il nous a paru possible de comparer l'action pharmacodynamique d'une molécule même complexe, telle que celle du pyramidon, et celle de l'un de ces radicaux (celui qui est porteur de l'activité pharmacodynamique). La molécule entière est administrée mécaniquement par voie trans-cutanée, et le radical actif par diélectrolyse.

On bénéficie alors au maximum des avantages liés à l'emploi de la diélectrolyse :

- concentration de l'activité pharmacodynamique
- action locale élective
- élimination lente et action retard.

Il semble dès lors que l'on puisse établir une méthode générale . pour l'étude expérimentale de nombreux médicaments.



Dans le présent travail nous avons montré qu'il était possible d'obtenir ~~in~~ vitro les réactions chimiques caractéristiques du pyramidon sur les fractions radicales introduites par diélectrolyse dans la pomme de terre.

Il est possible d'envisager l'action favorable de cette méthode pour l'emploi de divers autres agents pharmacodynamiques.



Vu, le Président de Thèse  
Professeur H. DESGREZ

Vu, le Doyen de la Faculté  
Professeur L. BINET

Vu et permis d'imprimer  
Le Recteur de l'Académie de Paris  
J. ROCHE



B I B L I O G R A P H I E

- I - ACKERMANN A. - Test à la pilocarpine et à l'acétylcholine.,  
Münster medizinische Wochenblatt.
- II- AUDUBERT R. Les propriétés électrochimiques des solutions  
C.D.U. Paris 1950
- III- BOURGUIGNON G. Exposé des titres et travaux scientifiques. Maretheux  
et Pactect Paris 1931 - 37
- IV - BOURGUIGNON G. La diélectrolyse - Arch. d'électr. méd. n° 58 p. 249,  
7 - 1932
- V - BRILLOUET R. Etude physique et thérapeutique des ions.  
Thèse de la Faculté de médecine de Paris 1907.
- VI - CHANTEUR J. Contribution à l'étude de la conductivité des tissus bio-  
logiques au courant continu.  
Mémoire pour le C.E.S. d'électroradiologie, Paris 1957.
- VII- DALLONGEVILLE B. Considérations sur les effets et les possibilités de  
la diélectrolyse en art dentaire.  
Thèse de la Faculté de médecine de Paris 1951
- VIII-DALLONGEVILLE - DELPA-MEUNIER . Test d'allergie par ionisation à l'his-  
tamine - Jour d'El. et de Rad. Tome 36, n° 11 12, 1955
- IX - DELHERM L. LAQUERRIERE A. L'ionothérapie électrique. - J.B. Baillière et  
Fils ed. Paris 1925.
- X - DELHERM L. Nouveau traité d'électroradiologie - Masson et <sup>C</sup>ie ed. Paris  
1951.
- XI - ENGEL I. Extraction des métaux du corps humain au moyen de l'électrolyse  
Thèse de la faculté de médecine de Nancy 1873.
- XII- ERIEL Ar. Electric ionisation - Bristol, Wright 1922
- XIII FABRE ROUFIER - Physiologie médicale - Paris 1954.



- XIV - GIDON F. Précis de l'ionothérapie électrique - P.U.F. éd. Paris 1929
- XV - HEILBRON J. BURBURY H.M. Dictionary of organics compounds. The constitution and Physical properties of the principal carbone compounds and their derivations. London Eyre and Spottiswood, 3 Vol. 1946
- XVI - HOLTHUSEN H. Sensibilisation des tissus néoplastiques.  
Ergebnisse der medizinischen Strahlenforschung. 1925
- XVII- JOLIBOIS P. Nouveaux aperçus sur l'électrolyse.  
Hermann éd. Paris 1943
- XVIII KIERNANDER - Physical medicine and Réhabilitation 1953
- XIX - LANGER E. Contribution à l'étude des actions générales de la diélectrolyse - Thèse de la Faculté de Médecine de Paris 1949.
- XX - LAQUERRIERE A. Discussion sur le mécanisme de pénétration des ions.  
Bul. de la Soc. Fr. d'El. Th. t X, p.172 - 1920
- XXI - LEDOUX S. Introduction des substances médicamenteuses dans la profondeur des tissus par le courant électrique. C.R. du 1<sup>o</sup> Cong. Inter. d'El. & de Rad. médicale 1900.
- XXII- LEDUC S. Les ions et les médications ioniques.  
L'oeuvre médico-chirurgicale n° 48
- XXIII LEWIS J. - Ionic Médication - Londres 1913
- XXIV- LUCAS - Thèse de la Faculté de Médecine de Paris 1922
- XXV - MAIGNON F. L'électrolyse au point de vue physico-chimique. I 1938
- XXVI- MASSEYEFF R. Electrophorèse sur papier. Thèse de la Faculté de Médecine de Paris 1952.
- XXVII MERCK Index Handbook of médical Chemistry.
- XXVIII MOORE W.J. - Traité de chimie physique - Dunod éd. Paris 1957
- XXIX- NOIX M. - l'électrolyse des produits allylés. Jour. d'El. & de Rad.  
n° 9 & 10, p. 194 - 1947
- XXX - ROLLIN J.P. La dérivation électrolytique des médicaments.  
Thèse de la Faculté de Médecine de Bordeaux 1932



XXXI - SEYOT - Thèse de la Faculté de Médecine de Nancy 1945

XXXII- STROHL A. - Précis de Physique médicale - Masson éd. Paris 1947

XXXIII STROHL-VERNET J. - ROUCAIROL J.C. - CECCALDI P.F. -

Etude de l'introduction électrolytique des ions à l'aide  
d'isotopes radioactifs.

C.R. de la Soc. de Biologie 24-6- 1950

XXXIV-WEISS G. Altérations histologiques par le courant de diélectrolyse.1890

XXXV - ZIMMERN - Diélectrolyse de l'ion carbaïne appliquée à l'anesthésie de  
surface.







AGEMP  
POLYCOPIE

8, rue Dante  
PARIS - V

Téléphone : ODÉon 58-94